



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ภัยเงียบจาก ยุงลาย

“โรคติดเชื้อไวรัสซิกา หรือ โรคไขซิกา” เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับไวรัสไข้เหลือง, ไวรัสแดงกึ่ง, ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคนี้ส่วนใหญ่ป่วยแล้วหายได้เอง อาการโรคไม่รุนแรง มีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์

อาการ



มีไข้



ปวดศีรษะ



ตาแดง



มีผื่นแดง



ปวดข้อ
ปวดกล้ามเนื้อ



หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการเหล่านี้จะทุเลาลงภายในเวลา 2 -7 วัน



ปกติ



ผิดปกติ

การติดเชื้อในสตรีมีครรภ์ อาจทำให้เกิดภาวะศีรษะเล็กในเด็กแรกเกิด (Microcephaly)



การรักษา

ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดย...



1 พักผ่อน
ให้เพียงพอ



2 ดื่มน้ำมาก ๆ



3 หากมีไข้ให้กินยาพาราเซตามอล
ห้ามกินแอสไพริน



การป้องกัน

1



เก็บบ้าน ให้สะอาดปลอดโปร่ง

2



เก็บขยะ คัดแยกขยะ
และทิ้งให้เรียบร้อย

3



เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้สนิท
หรือเทน้ำทิ้ง เพื่อไม่ให้ยุงลาย
วางไข่และอาศัยอยู่ในบ้าน

> หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ <

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กองสาธารณสุขท้องถิ่น : กลุ่มงานป้องกันโรค

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



How to กำจัด

สกัดโรคจากยุงลาย

ยุงลายเป็นพาหะนำโรค 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งมีวิธีง่ายๆ เพื่อป้องกันทั้ง 3 โรค ดังนี้

โดยวิธีทางกายภาพ

ใช้กระชอนตักลูกน้ำและตัวโม่งทิ้ง และขัดขอบภาชนะน้ำใช้ ป้องกันการเกิดยุงลาย



โดยวิธีทางชีวภาพ

ปล่อยปลากินลูกน้ำ เป็นการป้องกันและควบคุม โดยใช้หลักการของระบบนิเวศวิทยามาใช้



โดยวิธีทางเคมี

ทรายเคมีฟอส สามารถฆ่าลูกน้ำให้ตายได้ในระยะเวลา 1 วัน มีฤทธิ์คงทนนานไม่น้อยกว่า 3 เดือน ให้ใส่ในภาชนะน้ำใช้ อ่างน้ำส้วม จานรองกระถางต้นไม้ ป้องกันยุงลายเกิด

